

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI OSTETRICA AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO

PROVA PRATICA 01

- 1** Indicare la sequenza corretta delle operazioni da compiere per effettuare l'assistenza al periodo espulsivo fisiologico.
1. Assegnare il punteggio di Apgar durante il primo minuto di vita del neonato; porre il neonato sull'addome della donna, se lo desidera.
 2. Rispettare la posizione scelta dalla donna, favorendo il movimento del bacino e il rilassamento perineale.
 3. Garantire rispetto e intimità, incoraggiando la donna con empatia e voce pacata.
 4. Attendere il moto di restituzione spontaneo e accompagnare la rotazione esterna come conseguenza di quella interna delle spalle.
 5. Accogliere il neonato asciugandolo con un panno caldo e morbido.
 6. Far rompere la spinta quando la testa giunge al coronamento favorendo il suo disimpegno in modo lento e graduale.
 7. Attendere la comparsa di premito spontaneo irrefrenabile.
 8. Evitare esplorazioni vaginali e toccare il meno possibile i genitali della donna.
 9. Favorire una modalità di spinta spontanea osservando l'adattamento dei tessuti materni alla progressione della parte presentata.
 10. Se la donna lo gradisce, fare impacchi caldi sul perineo.
- A** 3 - 7 - 9 - 8 - 2 - 10 - 6 - 4 - 5 - 1
B 8 - 1 - 6 - 3 - 5 - 10 - 2 - 4 - 7 - 9
C 3 - 7 - 9 - 5 - 10 - 2 - 4 - 1 - 6 - 8

- 2** Indicare la sequenza corretta delle azioni da compiere per eseguire la somministrazione di un ovulo vaginale.
1. Praticare, se occorre, l'igiene intima.
 2. Garantire la privacy della donna.
 3. Lavarsi le mani.
 4. Rimuovere l'ovulo dall'involucro.
 5. Porre la donna in posizione ginecologica.
 6. Togliere i guanti e lavarsi le mani.
 7. Introdurre l'ovulo in vagina assicurandosi di porlo in profondità.
 8. Consigliare alla donna di rimanere sdraiata per almeno 15 minuti affinché l'ovulo non sgusci all'esterno dei genitali.
 9. Indossare i guanti monouso.
 10. Identificarsi e spiegare la procedura alla donna.
- A** 2 - 10 - 3 - 5 - 9 - 1 - 4 - 7 - 8 - 6
B 2 - 10 - 3 - 9 - 5 - 4 - 1 - 8 - 7 - 6
C 2 - 3 - 10 - 6 - 1 - 4 - 9 - 7 - 5 - 8

- 3 Indicare la sequenza corretta delle azioni da compiere per praticare la sutura di una lacerazione vaginale spontanea.
1. Posizionare la sacca graduata per raccogliere l'eventuale perdita ematica.
 2. Visualizzare l'apice della lacerazione
 3. Illuminare adeguatamente la parte interessata e spiegare alla donna la procedura che si andrà a compiere.
 4. Confrontare i lembi vaginali con passaggi a tutto spessore senza produrre slivellamenti.
 5. Attendere che l'anestetico faccia effetto.
 6. Disinfettare i genitali della donna e posizionare i telini sterili in modo da isolare il campo operatorio.
 7. Continuare la sutura a punti staccati, nel caso la soluzione di continuo prosegua fino all'area vulvare raggiungendo, senza comprometterla, l'area della forchetta.
 8. Preparare il materiale e il campo operatorio sterile.
 9. Posizionare il primo punto sopra l'apice della lacerazione.
 10. Infiltrare l'area di intervento con anestetico locale previa manovra di Lesser.
- A** 3 - 8 - 6 - 1 - 10 - 5 - 2 - 9 - 4 - 7
- B** 6 - 2 - 5 - 7 - 1 - 8 - 3 - 4 - 10 - 9
- C** 3 - 8 - 6 - 5 - 1 - 10 - 9 - 2 - 7 - 4

- 4 Rispetto all'assistenza ostetrica alla gravidanza oltre la quarantunesima settimana, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. L'ostetrica deve verificare la presenza di un esito negativo del Pap test entro i sei mesi precedenti e in caso fosse assente deve necessariamente proporre l'esame alla donna in previsione del parto.
 2. L'ostetrica ha il compito di informare la donna e la coppia rispetto alle possibili strategie naturali per favorire l'avvio spontaneo del travaglio, come il movimento corporeo e l'esercizio fisico.
 3. L'ostetrica deve necessariamente verificare le condizioni del collo dell'utero, anche in assenza di attività contrattile riferita dalla donna.
- A** 1-F; 2-V; 3-F
- B** 1-F; 2-F; 3-F
- C** 1-V; 2-V; 3-V

- 5 Rispetto alla misurazione del peso in gravidanza, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. Va eseguita solamente per le donne con BMI pregravidico maggiore di 30.
 2. È una competenza esclusiva del medico.
 3. È una procedura da eseguire solo nel terzo trimestre.
- A** 1-F; 2-F; 3-F
- B** 1-V; 2-F; 3-F
- C** 1-F; 2-F; 3-V

D00006

- 6 Con riferimento all'assistenza a una donna con diagnosi di IUS, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. È opportuno informare la donna sulla corretta modalità con cui sollevare pesi.
 2. È opportuno informare la donna sui benefici dell'utilizzo di una pancera.
 3. È opportuno aiutare la donna, attraverso specifici esercizi, ad aumentare la propria consapevolezza perineale.
- A** 1-V; 2-F; 3-V
B 1-F; 2-F; 3-V
C 1-V; 2-V; 3-V

D00007

- 7 Rispetto all'assistenza al tempo del parto relativo alla progressione della parte presentata, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. È necessario posizionare la donna con i piedi sopra i gambali del lettino.
 2. È possibile praticare degli impacchi caldi al perineo.
 3. È opportuno osservare la distensione dei tessuti del perineo fino al coronamento della parte presentata.
- A** 1-F; 2-V; 3-V
B 1-V; 2-V; 3-V
C 1-V; 2-F; 3-V

D00008

- 8 Rispetto all'utilizzo di farmaci durante l'allattamento, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. È opportuno sconsigliare l'assunzione di ibuprofene dato che può provocare la chiusura del dotto di Botallo.
 2. È opportuno informare la donna che il paracetamolo è l'unico farmaco che non interferisce con l'allattamento.
 3. È indispensabile estrarre il latte e gettarlo per almeno 6 ore dopo l'assunzione di ibuprofene 200 mg.
- A** 1-F; 2-F; 3-F
B 1-V; 2-V; 3-V
C 1-V; 2-F; 3-F

D00009

- 9 Rispetto alla misurazione della distanza sinfisi-fondo, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. È necessario eseguire la misurazione tre volte, calcolare la media dei dati raccolti e segnare il risultato sul grafico.
 2. È necessario misurare la distanza sinfisi-fondo in occasione di ogni visita a partire dalla trentesima settimana di gravidanza.
 3. Per praticare correttamente la misurazione della distanza sinfisi-fondo occorre seguire la linea alba.
- A** 1-V; 2-F; 3-F
B 1-F; 2-F; 3-F
C 1-F; 2-V; 3-V

10

Indicare la sequenza corretta delle operazioni da compiere per eseguire un tampone vaginale.

1. Applicare l'etichetta identificativa della paziente sul contenitore del tampone.
2. Lavare le mani e indossare i guanti.
3. Dilatare delicatamente le labbra esterne della vulva.
4. Identificare la paziente e assicurarsi che abbia acconsentito al trattamento dei suoi dati.
5. Inserire delicatamente il tampone in vagina e ruotarlo per raccogliere il campione.
6. Invitare la donna ad assumere la posizione ginecologica.
7. Riporre il tampone nell'apposito contenitore e inviarlo al laboratorio.

A 4 - 1 - 6 - 2 - 3 - 5 - 7

B 5 - 7 - 1 - 3 - 2 - 4 - 6

C 2 - 3 - 6 - 1 - 7 - 5 - 4

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI OSTETRICA AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO

PROVA PRATICA 02

- 1** Indicare la sequenza corretta delle operazioni da compiere per eseguire l'esame obiettivo del neonato sano nato a termine.
1. Osservare il collo del neonato per escludere ematomi o lesioni ossee.
 2. Valutare il colorito cutaneo.
 3. Effettuare l'esame cardio-vascolare e la valutazione della dinamica respiratoria.
 4. Osservare la conformazione del capo.
 5. Esaminare l'addome e i genitali.
 6. Praticare l'esame neurologico valutando i riflessi neonatali.
 7. Valutare il volto del neonato, con particolare attenzione a orecchie, naso e occhi.
 8. Esaminare gli arti e eseguire la manovra di Ortolani.
 9. Osservare e analizzare il cavo orale e il frenulo linguale.
 10. Osservare il neonato nel suo insieme.
- A** 10 - 2 - 4 - 7 - 9 - 1 - 3 - 5 - 8 - 6
- B** 2 - 7 - 9 - 10 - 4 - 1 - 3 - 8 - 5 - 6
- C** 6 - 8 - 9 - 7 - 4 - 10 - 1 - 3 - 2 - 5

- 2** Indicare la sequenza corretta delle azioni da compiere per eseguire un'irrigazione vaginale.
1. Presentarsi e spiegare la procedura alla donna.
 2. Applicare la cerata o una traversa sotto i glutei della donna.
 3. Inserire delicatamente la cannula in vagina e iniziare l'irrigazione.
 4. Eseguire o far eseguire alla donna l'igiene intima.
 5. Garantire la privacy della donna.
 6. Asciugare e riordinare il materiale utilizzato.
 7. Posizionare la padella sotto al bacino della donna.
 8. Indossare i guanti monouso.
 9. Estrarre la cannula e invitare la persona a sedersi sulla padella in modo che la soluzione fuoriesca.
 10. Invitare la donna ad assumere la posizione ginecologica.
- A** 5 - 1 - 4 - 10 - 8 - 2 - 7 - 3 - 9 - 6
- B** 7 - 1 - 10 - 4 - 8 - 2 - 5 - 3 - 9 - 6
- C** 10 - 1 - 9 - 6 - 8 - 2 - 5 - 4 - 7 - 3

- 3** In riferimento alla pratica dell'episiotomia, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. Si pratica nel caso in cui vada accelerata l'espulsione del feto in presenza di distress fetale.
 2. Si pratica quando il perineo è ben disteso.
 3. Prevede l'utilizzo di bisturi n. 10.
- A** 1-V; 2-V; 3-F
- B** 1-V; 2-F; 3-F
- C** 1-V; 2-F; 3-V

- 4 Con riferimento all'assistenza di una donna con diagnosi di IUS, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. È opportuno raccomandare alla donna di bere molto prima di uscire di casa.
 2. È opportuno consigliare alla donna di interrompere il getto urinario durante la minzione.
 3. È opportuno far sapere alla donna che attraverso la riabilitazione perineale potrà migliorare la sua qualità di vita.
- A** 1-F; 2-F; 3-V
B 1-F; 2-V; 3-V
C 1-V; 2-V; 3-V

- 5 Rispetto all'assistenza al tempo del parto relativo alla rotazione interna, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. È sempre opportuno posizionare la donna nella posizione ginecologica.
 2. È necessario far uscire la donna dalla vasca, se vi era immersa.
 3. È necessario suggerire alla donna di trattenere il fiato e spingere portando il mento verso lo sterno.
- A** 1-F; 2-F; 3-F
B 1-V; 2-V; 3-V
C 1-V; 2-F; 3-F

- 6 Rispetto all'utilizzo della perfusione ossitocica, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. Prevede il posizionamento dell'ago cannula.
 2. È necessario chiedere il consenso alla donna prima di praticare la perfusione ossitocica.
 3. È opportuno proporre la perfusione ossitocica a tutte le donne in travaglio.
- A** 1-V; 2-V; 3-F
B 1-V; 2-V; 3-V
C 1-F; 2-F; 3-F

- 7 Indicare la sequenza corretta delle operazioni da compiere per valutare gli annessi fetali dopo il secondamento.
1. Controllare la modalità di inserzione del funicolo.
 2. Verificare che non vi siano vasi che decorrono sulle membrane amniocoriali.
 3. Eliminare la placenta e gli annessi fetali smaltendoli nel secchio dei rifiuti speciali.
 4. Escludere la presenza di cotiledoni placentari succenturiati.
 5. Esaminare accuratamente la faccia materna.
 6. Verificare l'integrità delle membrane amniocoriali.
 7. Esaminare accuratamente la faccia fetale.
- A** 5 – 7 – 1 – 6 – 2 – 4 – 3
B 6 – 5 – 4 – 7 – 1 – 3 – 2
C 5 – 1 – 7 – 3 – 4 – 2 – 6

- 8 Rispetto all'assistenza ostetrica alla gravidanza oltre la quarantunesima settimana, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. L'ostetrica può proporre alla donna rimedi naturali per favorire l'avvio spontaneo del travaglio.
 2. L'ostetrica deve fornire counseling alla donna e alla coppia a proposito dei vari metodi di induzione del travaglio di parto.
 3. L'ostetrica può eseguire in autonomia lo scollamento delle membrane.
- A** 1-V; 2-V; 3-V
B 1-V; 2-F; 3-V
C 1-F; 2-V; 3-V

- 9 Rispetto alla misurazione della distanza sinfisi-fondo, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. È necessario misurare la distanza sinfisi-fondo in occasione di ogni visita a partire dalla dodicesima settimana di gravidanza.
 2. Per praticare correttamente la misurazione della distanza sinfisi-fondo non bisogna seguire la linea alba.
 3. Non è corretto effettuare la misurazione della distanza sinfisi-fondo con la paziente in posizione ortostatica.
- A** 1-F; 2-V; 3-V
B 1-F; 2-V; 3-F
C 1-F; 2-F; 3-V

- 10 Indicare la sequenza corretta delle operazioni da compiere per eseguire lo screening metabolico del neonato.
1. Riempire i moduli del kit per il prelievo dei campioni senza toccare il centro del cerchio della carta filtro.
 2. Praticare un'incisione sul tallone del neonato, poi asciugare la prima goccia di sangue con garza sterile.
 3. Individuare il punto del tallone del neonato dove praticare l'incisione.
 4. Presentarsi alla madre e al neonato, identificarli e descrivere loro la procedura.
 5. Appoggiare delicatamente la carta filtro su una grossa goccia di sangue e assicurarsi che tutto il cerchio ne risulti imbevuto.
 6. Ripetere il procedimento per tutti i cerchi, far asciugare i campioni all'aria per tre ore, poi inviare il materiale al laboratorio.
 7. Posizionare l'arto del neonato in modo da aumentare la pressione venosa.
 8. Disinfettare il sito con alcol al 70%, poi asciugare con garza sterile.
 9. Coprire l'area per 3 minuti con un asciugamano inumidito caldo.
 10. Lavare accuratamente le mani e indossare i guanti.
- A** 4 – 10 – 1 – 3 – 7 – 9 – 8 – 2 – 5 – 6
B 1 – 4 – 10 – 8 – 9 – 5 – 6 – 2 – 7 – 3
C 10 – 9 – 5 – 7 – 1 – 4 – 8 – 6 – 2 – 3

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI OSTETRICA AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO

PROVA PRATICA 03

- 1 Indicare la sequenza corretta delle operazioni da compiere per effettuare l'assistenza al periodo espulsivo fisiologico.
1. Assegnare il punteggio di Apgar durante il primo minuto di vita del neonato; porre il neonato sull'addome della donna, se lo desidera.
 2. Rispettare la posizione scelta dalla donna, favorendo il movimento del bacino e il rilassamento perineale.
 3. Garantire rispetto e intimità, incoraggiando la donna con empatia e voce pacata.
 4. Attendere il moto di restituzione spontaneo e accompagnare la rotazione esterna come conseguenza di quella interna delle spalle.
 5. Accogliere il neonato asciugandolo con un panno caldo e morbido.
 6. Far rompere la spinta quando la testa giunge al coronamento favorendo il suo disimpegno in modo lento e graduale.
 7. Attendere la comparsa di premito spontaneo irrefrenabile.
 8. Evitare esplorazioni vaginali e toccare il meno possibile i genitali della donna.
 9. Favorire una modalità di spinta spontanea osservando l'adattamento dei tessuti materni alla progressione della parte presentata.
 10. Se la donna lo gradisce, fare impacchi caldi sul perineo
- A** 3 - 7 - 9 - 8 - 2 - 10 - 6 - 4 - 5 - 1
- B** 8 - 1 - 6 - 3 - 5 - 10 - 2 - 4 - 7 - 9
- C** 3 - 7 - 9 - 5 - 10 - 2 - 4 - 1 - 6 - 8

- 2 Indicare la sequenza corretta delle azioni da compiere per eseguire la somministrazione di un ovulo vaginale.
1. Praticare, se occorre, l'igiene intima.
 2. Garantire la privacy della donna.
 3. Lavarsi le mani.
 4. Rimuovere l'ovulo dall'involucro.
 5. Porre la donna in posizione ginecologica.
 6. Togliere i guanti e lavarsi le mani.
 7. Introdurre l'ovulo in vagina assicurandosi di porlo in profondità.
 8. Consigliare alla donna di rimanere sdraiata per almeno 15 minuti affinché l'ovulo non sgusci all'esterno dei genitali.
 9. Indossare i guanti monouso.
 10. Identificarsi e spiegare la procedura alla donna.
- A** 2 - 10 - 3 - 5 - 9 - 1 - 4 - 7 - 8 - 6
- B** 2 - 10 - 3 - 9 - 5 - 4 - 1 - 8 - 7 - 6
- C** 2 - 3 - 10 - 6 - 1 - 4 - 9 - 7 - 5 - 8

- 3** Indicare la sequenza corretta delle azioni da compiere per praticare la sutura di una lacerazione vaginale spontanea.
1. Posizionare la sacca graduata per raccogliere l'eventuale perdita ematica.
 2. Visualizzare l'apice della lacerazione
 3. Illuminare adeguatamente la parte interessata e spiegare alla donna la procedura che si andrà a compiere.
 4. Confrontare i lembi vaginali con passaggi a tutto spessore senza produrre slivellamenti.
 5. Attendere che l'anestetico faccia effetto.
 6. Disinfettare i genitali della donna e posizionare i telini sterili in modo da isolare il campo operatorio.
 7. Continuare la sutura a punti staccati, nel caso la soluzione di continuo prosegua fino all'area vulvare raggiungendo, senza comprometterla, l'area della forchetta.
 8. Preparare il materiale e il campo operatorio sterile.
 9. Posizionare il primo punto sopra l'apice della lacerazione.
 10. Infiltrare l'area di intervento con anestetico locale previa manovra di Lesser.
- A** 3-8-6-1-10-5-2-9-4-7
- B** 6-2-5-7-1-8-3-4-10-9
- C** 3-8-6-5-1-10-9-2-7-4

- 4** In riferimento alla pratica dell'episiotomia, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. Si pratica nel caso in cui vada accelerata l'espulsione del feto in presenza di distress fetale.
 2. Si pratica quando il perineo è ben disteso.
 3. Prevede l'utilizzo di bisturi n. 10.
- A** 1-V; 2-V; 3-F
- B** 1-V; 2-F; 3-F
- C** 1-V; 2-F; 3-V

- 5** Con riferimento all'assistenza di una donna con diagnosi di IUS, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. È opportuno raccomandare alla donna di bere molto prima di uscire di casa.
 2. È opportuno consigliare alla donna di interrompere il getto urinario durante la minzione.
 3. È opportuno far sapere alla donna che attraverso la riabilitazione perineale potrà migliorare la sua qualità di vita.
- A** 1-F; 2-F; 3-V
- B** 1-F; 2-V; 3-V
- C** 1-V; 2-V; 3-V

- 6 Rispetto all'assistenza al tempo del parto relativo alla rotazione interna, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. È sempre opportuno posizionare la donna nella posizione ginecologica.
 2. È necessario far uscire la donna dalla vasca, se vi era immersa.
 3. È necessario suggerire alla donna di trattenere il fiato e spingere portando il mento verso lo sterno.
- A** 1-F; 2-F; 3-F
B 1-V; 2-V; 3-V
C 1-V; 2-F; 3-F

- 7 Rispetto all'utilizzo della perfusione ossitocica, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. Prevede il posizionamento dell'ago cannula.
 2. È necessario chiedere il consenso alla donna prima di praticare la perfusione ossitocica.
 3. È opportuno proporre la perfusione ossitocica a tutte le donne in travaglio.
- A** 1-V; 2-V; 3-F
B 1-V; 2-V; 3-V
C 1-F; 2-F; 3-F

- 8 Indicare la sequenza corretta delle operazioni da compiere per eseguire un tampone vaginale.
1. Applicare l'etichetta identificativa della paziente sul contenitore del tampone.
 2. Lavare le mani e indossare i guanti.
 3. Dilatare delicatamente le labbra esterne della vulva.
 4. Identificare la paziente e assicurarsi che abbia acconsentito al trattamento dei suoi dati.
 5. Inserire delicatamente il tampone in vagina e ruotarlo per raccogliere il campione.
 6. Invitare la donna ad assumere la posizione ginecologica.
 7. Riporre il tampone nell'apposito contenitore e inviarlo al laboratorio.
- A** 4 – 1 – 6 – 2 – 3 – 5 – 7
B 5 – 7 – 1 – 3 – 2 – 4 – 6
C 2 – 3 – 6 – 1 – 7 – 5 – 4

- 9 Rispetto all'assistenza ostetrica alla gravidanza oltre la quarantunesima settimana, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. L'ostetrica può proporre alla donna rimedi naturali per favorire l'avvio spontaneo del travaglio.
 2. L'ostetrica deve fornire counseling alla donna e alla coppia a proposito dei vari metodi di induzione del travaglio di parto.
 3. L'ostetrica può eseguire in autonomia lo scollamento delle membrane.
- A** 1-V; 2-V; 3-V
B 1-V; 2-F; 3-V
C 1-F; 2-V; 3-V

- 10** Rispetto alla misurazione della distanza sinfisi-fondo, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
1. È necessario misurare la distanza sinfisi-fondo in occasione di ogni visita a partire dalla dodicesima settimana di gravidanza.
 2. Per praticare correttamente la misurazione della distanza sinfisi-fondo non bisogna seguire la linea alba.
 3. Non è corretto effettuare la misurazione della distanza sinfisi-fondo con la paziente in posizione ortostatica.
- A** 1-F; 2-V; 3-V
- B** 1-F; 2-V; 3-F
- C** 1-F; 2-F; 3-V

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI OSTETRICA AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO

PROVA SCRITTA 01

-
- 1 A00001
- In un neonato di basso peso alla nascita, è necessario:**
- A** un continuo riscaldamento per mantenere l'isotermia
 - B** l'alimentazione per via parenterale
 - C** un monitoraggio continuo dei volumi di acqua introdotti
-
- 2 A00002
- Quale dei seguenti è un test probabilistico per la diagnosi prenatale?**
- A** Translucenza nucale
 - B** Villocentesi
 - C** Funicolocentesi
-
- 3 A00003
- Quale tra i seguenti NON è un contraccettivo di barriera?**
- A** Contraccettivo ormonale
 - B** Preservativo
 - C** Diaframma
-
- 4 A00004
- Rispetto a fenomeni tipici nell'evento nascita, è ERRATO affermare che:**
- A** le lochiazioni sono perdite di liquido amniotico che provengono dalla cavità uterina in travaglio
 - B** il "globo di sicurezza" si riferisce alla contrattura uterina dopo il secondamento
 - C** i "morsi uterini" sono manifestazioni dolorose in sede uterina durante i primi giorni del puerperio
-
- 5 A00005
- L'amenorrea è considerata patologica quando la cessazione della mestruazione si manifesta:**
- A** per un periodo superiore a 3-4 mesi
 - B** durante l'allattamento
 - C** mai
-
- 6 A00006
- Uno dei problemi nutrizionali più importanti in gravidanza è la carenza di:**
- A** acido folico
 - B** vitamina B₁₂
 - C** proteine
-
- 7 A00007
- Che cosa diminuisce solitamente in gravidanza?**
- A** La motilità gastrointestinale
 - B** La gittata cardiaca
 - C** La frequenza urinaria
-

-
- 8 A00008
- La terapia del diabete gestazionale in gravidanza prevede:**
- A** dieta e insulina solo se necessario, in base alle glicemie materne
 - B** solo antidiabetici orali
 - C** sempre e solo dieta
-
- 9 A00009
- Le donne con vaginite da Candida spesso:**
- A** soffrono di prurito e perdite vaginali dense biancastre
 - B** soffrono di bruciori e perdite vaginali maleodoranti
 - C** sono infertili e hanno avuto un elevato numero di partner
-
- 10 A00010
- Valori alti di α FP possono essere predittivi di:**
- A** spina bifida
 - B** idrocefalia
 - C** diabete
-
- 11 A00011
- L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l'allattamento al seno esclusivo per i primi:**
- A** 6 mesi
 - B** 3 mesi
 - C** 4-6 mesi
-
- 12 A00012
- L'endometriosi può essere caratterizzata da:**
- A** dismenorrea e dispareunia
 - B** disuria e dispareunia
 - C** dispareunia e cefalea
-
- 13 A00013
- L'ostetrica che assiste il chirurgo ginecologo deve conoscere le diverse tipologie di incisioni laparotomiche. Come viene chiamata l'incisione trasversale sovrapubica classica?**
- A** Pfannenstiel
 - B** Mackenrot-Mayland
 - C** Kustner bassa
-
- 14 A00014
- Quale delle seguenti pratiche facilita l'alimentazione notturna?**
- A** Tenere il neonato nella stessa stanza e allattare da sdraiata
 - B** Tirare il latte con un mastosuttore e somministrarlo al neonato con il biberon
 - C** Dare il ciuccio al neonato per facilitare il riposo della madre
-

-
- 15 A00015
- Il calo fisiologico neonatale corrisponde al:**
- A** 10% del peso corporeo alla nascita
 - B** 5% del peso corporeo alla nascita
 - C** 2,5% del peso corporeo alla nascita
-
- 16 A00016
- La fecondazione normalmente avviene:**
- A** nella tuba di Falloppio
 - B** nell'utero
 - C** nel canale cervicale
-
- 17 A00017
- Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?**
- A** La prolattina è indispensabile per la produzione di latte solamente nel periodo del puerperio
 - B** La prolattina è immunoattiva
 - C** L'azione della prolattina è inibita dal FIL
-
- 18 A00018
- Quanti e quali tipi di bacino femminile esistono?**
- A** Quattro: ginecoide, androide, antropoide e platipelloide
 - B** Due: ginecoide e androide
 - C** Tre: piatto, androide e antropoide
-
- 19 A00019
- La derivazione ventricolo-peritoneale viene utilizzata in caso di:**
- A** idrocefalo
 - B** insufficienza cardiaca destra
 - C** versamento pleurico bibasale
-
- 20 A00020
- I vaccini consigliati nei primi mesi di vita hanno una valenza nella prevenzione di malattie:**
- A** virali
 - B** autosomiche
 - C** batteriche
-

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI OSTETRICA AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO

PROVA SCRITTA 02

-
- 1 **L'isteroscopia permette di esaminare tutta la cavità uterina per mezzo di uno strumento:** B00001
- A** ottico illuminato
 - B** radiologico
 - C** a ultrasuoni
-
- 2 **Gli edemi in gravidanza:** B00002
- A** possono essere un segnale di patologia della gravidanza, in particolare se associati a pressione arteriosa elevata
 - B** sono sempre un evento fisiologico, legato all'aumentata pressione venosa degli arti inferiori
 - C** sono sempre un evento fisiologico, legato alla ridotta pressione oncotica del sangue
-
- 3 **Tutti i seguenti sono effetti avversi associati all'uso di contraccettivi orali TRANNE uno: quale?** B00003
- A** Aumento del rischio di carcinoma ovarico
 - B** Nausea
 - C** Tensione mammaria
-
- 4 **Il CA 125 è il marcatore tumorale d'elezione nelle neoplasie:** B00004
- A** dell'ovaio
 - B** del collo dell'utero
 - C** del colon retto
-
- 5 **Una gravidanza si considera a termine nel periodo:** B00005
- A** da 37 settimane a 41 settimane
 - B** da 40 settimane a 43 settimane
 - C** dopo 42 settimane
-
- 6 **La scala comportamentale di Cheops valuta:** B00006
- A** il dolore nei bambini che non sono in grado di descriverlo
 - B** il rischio di caduta nel paziente anziano
 - C** lo stato funzionale del paziente
-
- 7 **Quale tra le seguenti NON è un'indicazione assoluta all'esecuzione di taglio cesareo (TC)?** B00007
- A** TC iterativo
 - B** Coinfezione da virus Hiv e Hcv in donne non in terapia HAART
 - C** Prolasso di funicolo
-

-
- 8 B00008
Quale dei seguenti risultati sierologici indica che una donna è già immunizzata per la toxoplasmosi?
A IgG antitoxoplasma
B Sia IgG sia IgM antitoxoplasma
C IgM antitoxoplasma
-
- 9 B00009
Dov'è localizzato il foro di Botallo?
A Nel cuore del feto
B Nella placenta
C Nei polmoni del feto
-
- 10 B00010
Il test diretto di Coombs per la determinazione degli anticorpi anti-D si esegue:
A su emazie del feto
B su emazie della madre
C con il siero della madre
-
- 11 B00011
I fattori del parto sono:
A forza, canale, corpo mobile
B rottura d'utero e induzione
C peso fetale, malposizione, sovradistensione uterina
-
- 12 B00012
Quale tra i seguenti elementi è indice di attacco SCORRETTO?
A Il neonato ha in bocca solo il capezzolo
B Le guance del neonato sono piene
C Non si sentono schiocchi della lingua
-
- 13 B00013
L'esecuzione del Pap test è SCONSIGLIATA:
A durante le mestruazioni
B in gravidanza
C in menopausa
-
- 14 B00014
Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
A L'ovulazione avviene prima della fase follicolare
B Il ciclo mestruale può durare dai 21 ai 35 giorni
C L'ovulazione avviene prima della fase luteale
-

-
- 15 B00015
In seguito all'ovulazione, la temperatura basale:
A aumenta
B diminuisce
C aumenta solo se l'ovulo è fecondato
-
- 16 B00016
L'onfalocele è:
A una patologia caratterizzata dall'erniazione degli organi addominali nel cordone ombelicale
B un difetto di circolazione dovuto ad anomalie della forma del cordone ombelicale
C una dilatazione anomala delle vene del testicolo
-
- 17 B00017
Il modo più efficace per aumentare la produzione di latte materno è:
A allattare frequentemente
B riposarsi molto
C bere almeno un litro di latte ogni giorno
-
- 18 B00018
Il Baby Blues:
A è una risposta fisiologica agli importanti cambiamenti che porta la maternità
B è sinonimo di depressione post-partum
C è sinonimo di psicosi puerperale
-
- 19 B00019
Quale tra i seguenti è considerato segno di probabilità di gravidanza?
A L'amenorrea
B L'aumento di volume dell'addome
C La stipsi
-
- 20 B00020
Quale tra i seguenti fattori NON ha incidenza nella manifestazione della "distocia di spalla"?
A Sesso femminile del neonato
B Macrosomia fetale
C Obesità materna
-

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI OSTETRICA AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO

PROVA SCRITTA 03

-
- 1 C00001
- Quale tra i seguenti NON è un contraccettivo di barriera?**
- A** Contraccettivo ormonale
 - B** Preservativo
 - C** Diaframma
-
- 2 C00002
- L'isteroscopia permette di esaminare tutta la cavità uterina per mezzo di uno strumento:**
- A** ottico illuminato
 - B** radiologico
 - C** a ultrasuoni
-
- 3 C00003
- Gli edemi in gravidanza:**
- A** possono essere un segnale di patologia della gravidanza, in particolare se associati a pressione arteriosa elevata
 - B** sono sempre un evento fisiologico, legato all'aumentata pressione venosa degli arti inferiori
 - C** sono sempre un evento fisiologico, legato alla ridotta pressione oncotica del sangue
-
- 4 C00004
- L'amenorrea è considerata patologica quando la cessazione della mestruazione si manifesta:**
- A** per un periodo superiore a 3-4 mesi
 - B** durante l'allattamento
 - C** mai
-
- 5 C00005
- Il CA 125 è il marcatore tumorale d'elezione nelle neoplasie:**
- A** dell'ovaio
 - B** del collo dell'utero
 - C** del colon retto
-
- 6 C00006
- Una gravidanza si considera a termine nel periodo:**
- A** da 37 settimane a 41 settimane
 - B** da 40 settimane a 43 settimane
 - C** dopo 42 settimane
-
- 7 C00007
- La scala comportamentale di Cheops valuta:**
- A** il dolore nei bambini che non sono in grado di descriverlo
 - B** il rischio di caduta nel paziente anziano
 - C** lo stato funzionale del paziente
-

-
- 8 C00008
Quale tra le seguenti NON è un'indicazione assoluta all'esecuzione di taglio cesareo (TC)?
A TC iterativo
B Coinfezione da virus Hiv e Hcv in donne non in terapia HAART
C Prolasso di funicolo
-
- 9 C00009
Quale dei seguenti risultati sierologici indica che una donna è già immunizzata per la toxoplasmosi?
A IgG antitoxoplasma
B Sia IgG sia IgM antitoxoplasma
C IgM antitoxoplasma
-
- 10 C00010
L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l'allattamento al seno esclusivo per i primi:
A 6 mesi
B 3 mesi
C 4-6 mesi
-
- 11 C00011
I fattori del parto sono:
A forza, canale, corpo mobile
B rottura d'utero e induzione
C peso fetale, malposizione, sovradistensione uterina
-
- 12 C00012
Quale tra i seguenti elementi è indice di attacco SCORRETTO?
A Il neonato ha in bocca solo il capezzolo
B Le guance del neonato sono piene
C Non si sentono schiocchi della lingua
-
- 13 C00013
L'ostetrica che assiste il chirurgo ginecologo deve conoscere le diverse tipologie di incisioni laparotomiche. Come viene chiamata l'incisione trasversale sovrapubica classica?
A Pfannenstiel
B Mackenrot-Mayland
C Kustner bassa
-
- 14 C00014
L'esecuzione del Pap test è SCONSIGLIATA:
A durante le mestruazioni
B in gravidanza
C in menopausa
-

-
- 15 **Quale delle seguenti pratiche facilita l'alimentazione notturna?** C00015
- A** Tenere il neonato nella stessa stanza e allattare da sdraiata
 - B** Tirare il latte con un mastosuttore e somministrarlo al neonato con il biberon
 - C** Dare il ciuccio al neonato per facilitare il riposo della madre
-
- 16 **La fecondazione normalmente avviene:** C00016
- A** nella tuba di Falloppio
 - B** nell'utero
 - C** nel canale cervicale
-
- 17 **Il modo più efficace per aumentare la produzione di latte materno è:** C00017
- A** allattare frequentemente
 - B** riposarsi molto
 - C** bere almeno un litro di latte ogni giorno
-
- 18 **Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?** C00018
- A** La prolattina è indispensabile per la produzione di latte solamente nel periodo del puerperio
 - B** La prolattina è immunoattiva
 - C** L'azione della prolattina è inibita dal FIL
-
- 19 **Quanti e quali tipi di bacino femminile esistono?** C00019
- A** Quattro: ginecoide, androide, antropoide e platipelloide
 - B** Due: ginecoide e androide
 - C** Tre: piatto, androide e antropoide
-
- 20 **Il Baby Blues:** C00020
- A** è una risposta fisiologica agli importanti cambiamenti che porta la maternità
 - B** è sinonimo di depressione post-partum
 - C** è sinonimo di psicosi puerperale
-

