

OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGNANO

Indicatore	N	Rischio grezzo	Rischio ADJ	RR ADJ	p ADJ	RR Bench	p Bench
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	124	8.06	8.56	0.86	0.637	1.95	0.042
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni dal ricovero	75	13.33	15.90	0.88	0.682	2.09	0.019
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 48 ore: mortalità a 30 giorni dal ricovero	2	0.00	-	-	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	124	1.61	1.29	0.04	0.000	0.01	0.000
IMA: Mortalità a 1 anno	100	10.00	15.01	1.37	0.341	2.09	0.026
IMA: MACCE a 1 anno	100	23.00	26.26	1.08	0.677	1.38	0.075
IMA: proporzione di ricoveri successivi entro 2 giorni	124	9.68	9.11	1.23	0.473	1186.27	0.000
IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	124	15.32	12.91	0.24	0.000	0.13	0.000
STEMI:mortalità a 30 giorni(grezzi)	46	21.74	-	-	-	-	-
NO STEMI:mortalità a 30 giorni(grezzi)	78	0.00	-	-	-	-	-
STEMI: proporzione di PTCA (grezzi)	46	4.35	-	-	-	-	-
NO STEMI:proporzione di PTCA (grezzi)	78	0.00	-	-	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero	181	17.68	16.16	1.51	0.021	74.38	0.000
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni a 30 giorni	117	17.95	18.25	1.25	0.269	7.95	0.000
Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero	92	8.70	9.43	0.78	0.494	2.36	0.020
Ictus: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	85	15.29	15.08	1.47	0.139	2.68	0.000
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero	134	7.46	8.25	0.94	0.839	82.81	0.000
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	128	17.97	19.33	1.42	0.061	24.88	0.000
Colecistectomia in regime ordinario: proporzione di colecistectomie laparoscopiche	134	93.28	93.76	1.02	0.218	0.96	0.005
Colecistectomia in regime ordinario/day surgery: proporzione di colecistectomie laparoscopiche	134	93.28	93.85	1.02	0.228	0.96	0.005
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	125	1.60	1.84	0.13	0.003	0.02	0.000
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in regime ordinario con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	125	51.20	54.10	0.88	0.134	0.55	0.000
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	282	3.55	3.16	1.35	0.344	121.63	0.000
Colecistectomia laparoscopica regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	282	0.71	0.66	0.62	0.498	90.16	0.000
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	551	15.06	13.97	0.53	0.000	2.94	0.000
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	985	0.71	0.79	2.01	0.064	-	-
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	346	1.16	1.34	1.88	0.205	-	-

Parti naturali: riammissioni ospedaliere durante il puerperio	985	0.30	0.30	0.57	0.332	57.11	0.000
Parti cesarei: riammissioni ospedaliere durante il puerperio	346	1.16	1.22	1.59	0.349	183.34	0.000
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni dal ricovero	77	11.69	14.44	2.40	0.008	8.86	0.000
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	77	40.26	39.88	0.99	0.960	0.43	0.000
Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	21	0.00	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni dall'intervento	23	0.00	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	43	4.65	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	75	6.67	4.22	0.97	0.941	59.43	0.000
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	22	4.55	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: % interventi in laparoscopia	34	8.82	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM retto: % interventi in laparoscopia	12	41.67	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	27	0.00	-	-	-	-	-

CAUSA PIA OSPITALIERA UBOLDO-CERNUSCO SN

Indicatore	N	Rischio grezzo	Rischio ADJ	RR ADJ	p ADJ	RR Bench	p Bench
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	113	9.73	10.29	1.03	0.921	2.34	0.007
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni dal ricovero	77	14.29	18.11	1.00	0.987	2.38	0.003
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 48 ore: mortalità a 30 giorni dal ricovero	14	0.00	-	-	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	113	12.39	11.26	0.31	0.000	0.12	0.000
IMA: Mortalità a 1 anno	102	11.76	14.24	1.30	0.397	1.98	0.027
IMA: MACCE a 1 anno	102	23.53	23.90	0.98	0.918	1.25	0.221
IMA: proporzione di ricoveri successivi entro 2 giorni	113	20.35	19.75	2.66	0.000	2571.23	0.000
IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	113	10.62	8.54	0.16	0.000	0.09	0.000
STEMI:mortalità a 30 giorni(grezzi)	36	19.44	-	-	-	-	-
NO STEMI:mortalità a 30 giorni(grezzi)	75	5.33	-	-	-	-	-
STEMI: proporzione di PTCA (grezzi)	36	33.33	-	-	-	-	-
NO STEMI:proporzione di PTCA (grezzi)	75	2.67	-	-	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero	217	13.82	14.29	1.34	0.109	65.78	0.000
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni a 30 giorni	153	15.03	15.37	1.05	0.801	6.70	0.000
Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero	19	10.53	-	-	-	-	-
Ictus: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	17	23.53	-	-	-	-	-
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero	87	6.90	6.09	0.69	0.371	61.09	0.000
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	81	17.28	18.55	1.37	0.200	23.88	0.000
Colecistectomia in regime ordinario: proporzione di colecistectomie laparoscopiche	74	91.89	92.43	1.00	0.919	0.95	0.019
Colecistectomia in regime ordinario/day surgery: proporzione di colecistectomie laparoscopiche	74	91.89	92.53	1.00	0.934	0.95	0.019
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	68	0.00	-	-	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in regime ordinario con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	68	10.29	10.86	0.18	0.000	0.11	0.000
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	150	2.00	1.87	0.80	0.699	72.08	0.000
Colecistectomia laparoscopica regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	150	0.67	0.66	0.61	0.625	89.31	0.001
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	435	12.64	14.97	0.57	0.000	3.15	0.000
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	764	0.39	0.46	1.17	0.786	-	-
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	278	0.00	-	-	-	-	-
Parti naturali: riammissioni ospedaliere durante il puerperio	764	0.52	0.53	1.00	0.998	99.73	0.000
Parti cesarei: riammissioni ospedaliere durante il puerperio	278	0.36	0.39	0.51	0.496	58.33	0.004
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni dal ricovero	105	3.81	4.42	0.73	0.540	2.71	0.054
Frattura del collo del femore:	105	32.38	31.14	0.78	0.079	0.33	0.000

intervento chirurgico entro 2 giorni								
Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	8	0.00	-	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni								
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	39	10.26	-	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni								
Intervento chirurgico per TM colon: % interventi in laparoscopia	13	7.69	-	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM retto: % interventi in laparoscopia								
	2	0.00	-	-	-	-	-	-

OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO

Indicatore	N	Rischio grezzo	Rischio ADJ	RR ADJ	p ADJ	RR Bench	p Bench
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	23	30.43	-	-	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni dal ricovero	18	33.33	-	-	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 48 ore: mortalità a 30 giorni dal ricovero	2	0.00	-	-	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	23	8.70	-	-	-	-	-
IMA: Mortalità a 1 anno	13	23.08	-	-	-	-	-
IMA: MACCE a 1 anno	13	23.08	-	-	-	-	-
IMA: proporzione di ricoveri successivi entro 2 giorni	23	26.09	-	-	-	-	-
IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	23	8.70	-	-	-	-	-
STEMI:mortalità a 30 giorni(grezzi)	10	60.00	-	-	-	-	-
NO STEMI:mortalità a 30 giorni(grezzi)	12	0.00	-	-	-	-	-
STEMI: proporzione di PTCA (grezzi)	10	10.00	-	-	-	-	-
NO STEMI:proporzione di PTCA (grezzi)	12	8.33	-	-	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero	154	15.58	12.87	1.21	0.365	59.25	0.000
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni a 30 giorni	108	14.81	16.15	1.10	0.668	7.04	0.000
Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero	24	25.00	-	-	-	-	-
Ictus: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	19	5.26	-	-	-	-	-
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero	54	11.11	13.39	1.52	0.289	134.35	0.000
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	48	16.67	-	-	-	-	-
Colecistectomia in regime ordinario: proporzione di colecistectomie laparoscopiche	65	86.15	87.38	0.95	0.193	0.90	0.009
Colecistectomia in regime ordinario/day surgery: proporzione di colecistectomie laparoscopiche	65	86.15	87.51	0.95	0.188	0.90	0.009
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	56	0.00	-	-	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in regime ordinario con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	56	42.86	36.81	0.60	0.004	0.37	0.000
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	113	2.65	2.77	1.18	0.771	106.63	0.000
Colecistectomia laparoscopica regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	113	0.00	-	-	-	-	-
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	368	23.10	27.11	1.03	0.768	5.71	0.000
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	561	0.71	0.81	2.06	0.147	-	-
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	303	0.00	-	-	-	-	-
Parti naturali: riammissioni ospedaliere durante il puerperio	561	0.18	0.18	0.34	0.286	34.43	0.012
Parti cesarei: riammissioni ospedaliere durante il puerperio	303	0.00	-	-	-	-	-
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni dal ricovero	95	6.32	8.15	1.35	0.452	5.00	0.000
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	95	72.63	71.27	1.77	0.000	0.76	0.000
Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	34	2.94	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni dall'intervento	6	0.00	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco:	17	5.88	-	-	-	-	-

mortalità a 30 giorni								
Intervento chirurgico per TM colon:	39	0.00	-	-	-	-	-	-
mortalità a 30 giorni								
Intervento chirurgico per TM retto:	5	20.00	-	-	-	-	-	-
mortalità a 30 giorni								
Intervento chirurgico per TM colon: %	19	15.79	-	-	-	-	-	-
interventi in laparoscopia								
Intervento chirurgico per TM retto: %	3	33.33	-	-	-	-	-	-
interventi in laparoscopia								
Intervento chirurgico per TM prostata:	2	0.00	-	-	-	-	-	-
riammissioni a 30 giorni								

OSPEDALE CROTTA OLTROCCHI-VAPRIO D'ADDA

Indicatore	N	Rischio grezzo	Rischio ADJ	RR ADJ	p ADJ	RR Bench	p Bench
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	9	22.22	-	-	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni dal ricovero	7	28.57	-	-	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	9	0.00	-	-	-	-	-
IMA: Mortalità a 1 anno	15	13.33	-	-	-	-	-
IMA: MACCE a 1 anno	15	33.33	-	-	-	-	-
IMA: proporzione di ricoveri successivi entro 2 giorni	9	0.00	-	-	-	-	-
IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	9	0.00	-	-	-	-	-
STEMI:mortalità a 30 giorni(grezzi)	2	50.00	-	-	-	-	-
NO STEMI:mortalità a 30 giorni(grezzi)	7	14.29	-	-	-	-	-
STEMI: proporzione di PTCA (grezzi)	2	0.00	-	-	-	-	-
NO STEMI:proporzione di PTCA (grezzi)	7	0.00	-	-	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero	79	3.80	2.72	0.25	0.019	12.52	0.006
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni a 30 giorni	55	18.18	-	-	-	-	-
Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero	7	14.29	-	-	-	-	-
Ictus: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	6	0.00	-	-	-	-	-
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero	27	3.70	-	-	-	-	-
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	26	3.85	-	-	-	-	-
Colecistectomia in regime ordinario: proporzione di colecistectomie laparoscopiche	45	93.33	-	-	-	-	-
Colecistectomia in regime ordinario/day surgery: proporzione di colecistectomie laparoscopiche	45	93.33	-	-	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	42	0.00	-	-	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in regime ordinario con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	41	0.00	-	-	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	83	12.05	-	-	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	83	3.61	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	13	7.69	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	11	18.18	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: % interventi in laparoscopia	7	14.29	-	-	-	-	-

P.O."ANASTASIO ZAPPATONI"-CASSANO D'ADDA

Indicatore	N	Rischio grezzo	Rischio ADJ	RR ADJ	p ADJ	RR Bench	p Bench
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero	11	0.00	-	-	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni a 30 giorni	8	0.00	-	-	-	-	-
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero	106	0.94	1.17	0.13	0.043	11.72	0.044
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	105	9.52	10.85	0.80	0.453	13.96	0.001
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni dal ricovero	2	0.00	-	-	-	-	-
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	2	0.00	-	-	-	-	-

OSPED. DI CIRCOLO SERBELLONI-GORGONZOLA

Indicatore	N	Rischio grezzo	Rischio ADJ	RR ADJ	p ADJ	RR Bench	p Bench
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero	2	100.00	-	-	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni dal ricovero	2	100.00	-	-	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	2	0.00	-	-	-	-	-
IMA: proporzione di ricoveri successivi entro 2 giorni	2	0.00	-	-	-	-	-
IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero successivo entro 7 giorni	2	0.00	-	-	-	-	-
STEMI:mortalità a 30 giorni(grezzi)	2	100.00	-	-	-	-	-
STEMI: proporzione di PTCA (grezzi)	2	0.00	-	-	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero	2	100.00	-	-	-	-	-
Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero	1	100.00	-	-	-	-	-
Ictus: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	1	0.00	-	-	-	-	-
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero	1	100.00	-	-	-	-	-
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	1	0.00	-	-	-	-	-