



U.O. RADIOLOGIA

SERVIZIO di RISONANZA MAGNETICA e TAC

ISTRUZIONI PER LA PREMEDICAZIONE ALLE ALLERGIE AL MEZZO DI CONTRASTO (MDC) PER ESAMI TAC e RMN

La diagnosi certa di allergia ai mezzi di contrasto iodati o mezzi di contrasto per Risonanza Magnetica, risulta estremamente difficile e non esistono test affidabili per la loro diagnosi.

Per tali motivi, ai pazienti che presentano una storia **CERTA di reazioni avverse a mezzi di contrasto**, il medico radiologo valuterà una metodica alternativa di pari efficacia diagnostica che non necessiti di mezzo di contrasto. Nel caso in cui non vi siano alternative viene suggerita la seguente preparazione con lo scopo di prevenire o limitare le eventuali reazioni attraverso una specifica desensibilizzazione.

E' necessario farsi prescrivere dal proprio medico di famiglia il seguente farmaco cortisonico:

PREDNISONE = DELTACORTENE FORTE - compresse da 25 mg.

MODALITA' DI ASSUNZIONE:

2 compresse 13 ore prima dell'esame

2 compresse 7 ore prima dell'esame

2 compresse 1 ora prima dell'esame

Verrà inoltre somministrato, dal personale infermieristico del servizio, per via parenterale, 1 ora prima dell'esame 1 fiala di TRIMETON 10 mg.

IMPORTANTE - presentarsi in Radiologia almeno 1 ora prima dell'esame.